

## イミグラン注3

### 【この薬は？】

販売名	イミグラン注3 IMIGRAN Injection 3
一般名	スマトリプタンコハク酸塩 Sumatriptan Succinate
含有量 (1アンプル中)	スマトリプタンコハク酸塩4.2mg (スマトリプタンとして3.0mg)

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、5-HT<sub>1B/1D</sub>受容体作動型片頭痛治療剤と呼ばれるグループに属する注射薬です。
- ・この薬は、セロトニン（5-HT）と呼ばれる物質のうちの5-HT<sub>1B</sub>と5-HT<sub>1D</sub>受容体を選択的に作用し、頭痛発作時の拡張しすぎた頭部の血管を収縮させること、および神経末端からの炎症を起こす物質の放出を抑えることにより、片頭痛を改善します。
- ・次の病気の人に、医療機関で使用されます。

**片頭痛、群発頭痛**

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にイミグラン注に含まれる成分で過敏症のあった人
- ・過去に心筋梗塞になったことがある人、虚血性心疾患であるかまたはその症状や兆候がある人、異型狭心症（冠動脈攣縮）がある人
- ・脳血管障害や一過性脳虚血性発作になったことがある人
- ・末梢血管障害がある人
- ・血圧管理が不十分な高血圧の人
- ・肝臓に重篤な障害がある人
- ・エルゴタミン、エルゴタミン誘導体含有製剤、あるいは5-HT<sub>1B/1D</sub>受容体作動薬（イミグランと同じ作用の他の片頭痛治療薬）を使っている人
- ・モノアミンオキシダーゼ阻害剤（MAO阻害剤）を使用している人、あるいはモノアミンオキシダーゼ阻害剤の使用を中止して2週間以内の人
- ・家族性片麻痺性片頭痛、弧発性片麻痺性片頭痛、脳底型片頭痛あるいは眼筋麻痺性片頭痛の人

○次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・虚血性心疾患の可能性のある人（例えば、虚血性心疾患を疑わせる重篤な不整脈がある人、閉経後の女性、40歳以上の男性、冠動脈疾患になりやすい人）
- ・過去にてんかん様発作があった人、あるいはてんかん様発作発現を来しやすい人（脳炎等の脳疾患がある人）
- ・肝臓に障害がある人
- ・腎臓に障害がある人
- ・高齢の人
- ・過去にスルホンアミド系薬剤で過敏症のあった人
- ・血圧管理が十分行われている高血圧の人
- ・脳血管障害の可能性のある人

○この薬には併用してはいけない薬 [エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン（クリアミン）、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩（ジヒデルゴット）、エルゴメトリンマレイン酸塩（エルゴメトリンF）、メチルエルゴメトリンマレイン酸塩（メテルギン）、ゾルミトリプタン（ゾーミッグ）、エレクトリプタン臭化水素酸塩（レルパックス）、リザトリプタン安息香酸塩（マクスルト）、ナラトリプタン塩酸塩（アマージ）、モノアミンオキシダーゼ阻害剤] や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

この薬は注射薬です。

### ●使用量および回数

使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。  
通常、成人の使用量および回数は、次のとおりです。

〔片頭痛の場合〕

一回量	1 アンプル
使用回数	頭痛発作発現時に1 アンプルを使用します。 1 回の頭痛発作において、初回の注射で頭痛が軽減した場合には、24 時間以内に起こった次の頭痛発作に対して注射することができますが、初回と2 回目の注射の間は1 時間以上の間隔をあけてください。 1 日2 アンプルを超えて使用しないでください。

#### 〔群発頭痛の場合〕

一回量	1 アンプル
使用回数	頭痛発作発現時に1 アンプルを使用します。 1 日2 回まで注射することができますが、初回と2 回目の注射の間は1 時間以上の間隔をあけてください。 1 日2 アンプルを超えて使用しないでください。

#### 〔この薬を使用する全ての方に共通〕

- ・この薬は頭痛発作発現時にのみ使用し、予防を目的として使用しないでください。
- ・この薬を使用しても全く効果が認められない場合には、他の原因による頭痛の可能性があるので、それ以上この薬を使用せず、医師に相談してください。
- ・イミグラン錠またはイミグラン点鼻液と組み合わせて使用する場合、
  - ・この薬を注射した後に、イミグラン錠またはイミグラン点鼻液を使用する場合は、1 時間以上の間隔をあけてください。
  - ・イミグラン錠またはイミグラン点鼻液を使用後に、この薬を注射する場合は、2 時間以上の間隔をあけてください。

#### ●どのように使用するか？

- ・使用量、使用回数、使用方法等は、医師が決め、医療機関において皮下に注射されます。

#### 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬を使用後、胸の痛みや胸の圧迫感などの一時的な症状があらわれることがあるので（強く咽喉頭の辺りまで症状が出る場合もあります）、これらの症状があらわれた場合には、ただちに医師に連絡してください。
- ・心血管系の病気がない人でも、心臓に重篤な障害が極めてまれに起こることがあるので、異常を感じた場合には、ただちに医師に連絡してください。
- ・頭痛発現時あるいはこの薬を投与した後に眠気があらわれることがありますので、この薬を使用している間は自動車の運転等危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- ・この薬を含むトリプタン系の薬により、頭痛が悪化することがあるので、この薬を使用しても良くなる場合には医師に相談してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳を避けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬

を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。


重大な副作用	主な自覚症状
アナフィラキシー ショック	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しい
不整脈 ふせいみやく	めまい、動悸、脈が遅くなる、気を失う、脈がとぶ
狭心症あるいは心 筋梗塞を含む虚血 性心疾患様症状 きょうしんしょうあるいはし んきんこうそくをふくむきよ けつせいしんしつかんよう しょうじょう	しめ付けられるような胸の痛み、胸を強く押さえつけられた感じ、冷汗が出る、息苦しい
てんかん様発作 てんかんようほっさ	顔や手足の筋肉がぴくつく、一時的にボーっとする、意識の低下、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える
薬剤の使用過多に よる頭痛 やくざいのしょうかたによる ずつう	頭痛

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	ふらつき、冷汗が出る、顔や手足の筋肉がぴくつく
頭部	めまい、気を失う、一時的にボーっとする、意識の低下、頭痛
顔面	顔面蒼白
口や喉	喉のかゆみ
胸部	動悸、息苦しい、しめ付けられるような胸の痛み、胸を強く押さえつけられた感じ
手・足	手足が冷たくなる、脈が遅くなる、脈がとぶ、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹

## 【この薬の形は？】

性状	無色～淡黄色澄明の液
----	------------

内容量	1 アンプル中 1 mL
形状	

### 【この薬に含まれているのは？】

有効成分	スマトリプタンコハク酸塩
添加物	塩化ナトリウム

### 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：

グラクソ・スミスクライン株式会社 (<http://jp.gsk.com>)

カスタマー・ケア・センター

電話：0120-561-007

受付時間：9時～17時45分（土、日、祝日および当社休業日を除く）