

# フルナーゼ®を処方された患者の皆様へ



## 鼻噴霧用ステロイド薬とは

- このお薬は鼻粘膜局所の炎症を抑えるお薬です。アレルギーによる、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどの鼻症状を改善します。
- 鼻の粘膜に直接噴霧して用いるため、内服薬に比べて少ない薬の量で効果が得られ、全身性の副作用も少ないとされています。

## お薬を正しく使用していただくために以下の事項をお守り下さい

- 医師に指示された用法・用量を守って使用して下さい。
- このお薬は使用後すぐに鼻症状を改善する薬剤ではありません。通常、症状が改善するまでには数日かかります。**毎日継続して使用することで効果を得ることができます。**  
(忘れずに継続して使用していただくために、下の「噴霧回数チェック表」をご活用下さい。)
- 容器の先端部分を針などで突くことは絶対にしないで下さい。  
(先端の穴が破損し、噴霧できなくなります。)
- ガラス容器を用いているため、衝撃を与えないように取り扱いに注意して下さい。
- 妊娠をしている可能性がある場合には、医師にご相談下さい。



薬液の残量が確認できます

## ● 噴霧回数チェック表

このお薬は、1本(容器)で56回の定量噴霧ができるように設計されています。

★噴霧するごとに、下の記入欄を1個ずつ✓チェックしましょう。

使用開始日： 月 日



左右各1回噴霧

日数	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
朝							
夜							

日数	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	13日目	14日目
朝							
夜							

このお薬、または噴霧方法についてご質問がありましたら、医師または薬剤師にお問い合わせ下さい。

●使用方法については裏面をご覧ください。

# フルナーゼ®点鼻液50μg 56噴霧用の使い方

## 新しい噴霧器を使い始める時

最初に使用する時だけ、よく振ったあとにしっかり7回押して、液が完全に霧状になるのを確認して下さい。2回目からはこの操作は不要です。



2



緑のキャップをはずし、容器を矢印の方向によく振って下さい。

4



お薬を鼻に噴霧した後は、鼻の奥まで行きわたらせるために、数秒間上を向いて、鼻でゆっくり息をして下さい。このとき、鼻をかまないで下さい。

## お薬の使用方法

1



お薬を使う前に鼻をかんで、できるだけ鼻の通りをよくして下さい。

3



頭をうつむき加減にし、容器を垂直に立てて持ちながら鼻の穴に容器の先を入れ、そのまま、しっかりと止まるところまで押し上げ、1回噴霧して下さい。もう片方の鼻にも同じようにして下さい。

5



使用後は容器の先端をきれいに拭いて、必ず緑のキャップをし、容器を立てた状態で室温で保管して下さい。

製造販売元（輸入）

グラクソ・スミスクライン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1

グラクソ・スミスクラインの製品に関するお問い合わせ・資料請求先  
TEL : 0120-561-007 (9:00~17:45 / 土日祝日および当社休業日を除く)  
FAX : 0120-561-047 (24時間受付)

FNXX0117-P1712N  
改訂年月2017年12月(MKT)