

## エンクラッセ 62.5μg エリプタ 7 吸入用 エンクラッセ 62.5μg エリプタ 30 吸入用

### 【この薬は？】

販売名	エンクラッセ 62.5μg エリプタ 7 吸入用 エンクラッセ 62.5μg エリプタ 30 吸入用 ENCRUSE 62.5μg ELLIPTA 7doses ENCRUSE 62.5μg ELLIPTA 30doses
一般名	ウメクリジニウム臭化物 Umeclidinium Bromide
含有量 (1ブリスター*中)	ウメクリジニウム臭化物 74.2μg (ウメクリジニウムとして62.5μg)
*:1回分の薬剤(粉末)	

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」

<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・ この薬は、長時間作用する気管支拡張剤と呼ばれるグループに属する吸入剤です。
- ・ この薬は、ムスカリン受容体を阻害し、長時間にわたり気管支を拡げることにより、呼吸を楽にします。吸入してすぐに効果はあらわれません。
- ・ 次の目的で処方されます。

**慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解**

- ・ この薬は、毎日規則正しく使用する薬で、急な症状の悪化を速やかに鎮める薬ではありません。
- ・ この薬は体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに使用し続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・ 閉塞隅角（へいそくぐうかく）緑内障の人
- ・ 前立腺肥大などによる排尿障害がある人
- ・ 過去にエンクラッセに含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人

○次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・ 心不全、心房細動、期外収縮のある人、または過去にそれらの病気にかかったことのある人
- ・ 前立腺肥大のある人

## 【この薬の使い方は？】

この薬は吸入薬で、飲み薬ではありません。

### ●使用量および回数

1日に使用する回数は1回までです。

通常、成人の使用量および回数は、次のとおりです。

一回量	1吸入（カバーをカチッと音がするまで1回開ける）
使用回数	1日1回 なるべく同じ時間帯に吸入する

### ●どのように使用するか？

吸入方法に関しては医師や薬剤師から説明を受けてください。使用説明書にも書かれていますので、よく読んで使用してください。

また、巻末の〔エンクラッセ 62.5μg エリプタの吸入方法〕も参照してください。

不明な場合は、医師や薬剤師に相談してください。

### ●この薬を吸入できる回数は？

この薬の中には7吸入用には7回分、30吸入用には30回分の薬が入っています。処方されたときはカウンターに「7」あるいは「30」と記載されていますが、吸入する時にカバーをカチッと音がするまで開けると自動的にカウンターが動き、残りの使用回数が確認できます。この表示が「0」（ゼロ）になったら使用しないで新しい薬と交換してください。

### ●効果が不十分な場合の対応

この薬を毎日規則的に使用しても効果が不十分な場合には、できるだけ早く受診してください。

### ●使用し忘れた場合の対応

- ・ 2回分を1度に吸入しないでください。
- ・ 気付いたらすぐに1回分吸入してください。
- ・ その後の吸入は、通常吸入している時間帯に1回分を吸入するようにしてく

ださい。ただし、1日1回を超えて吸入しないでください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

口内乾燥（口の渇き）、視調節障害（ピントが合いにくい）、頻脈などの症状があらわれることがあります。

このような症状があらわれたら、ただちに使用を中止し、受診してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・ この薬は毎日規則正しく使用する薬で、急な症状の悪化を速やかに鎮める薬ではありません。正しく使用しても効果が認められない場合には、医師に相談してください。
- ・ 吸入薬を使用した場合、薬剤の吸入そのものにより気管支痙攣（息がぜいぜいする、息をするときヒューヒューと音がする、突然の息切れ）があらわれることがあります。このような症状があらわれた場合は、使用を中止し、ただちに受診してください。
- ・ 妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・ 授乳している人は使用の継続について医師に相談し、授乳の中止あるいは本剤の投与を中止してください。
- ・ 他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。


このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
心房細動 しんぼうさいどう	めまい、胸がドキドキする、動く時の動悸、気を失う

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
頭部	めまい
胸部	胸がドキドキする、動く時の動悸
その他	気を失う

## 【この薬の形は？】



## 【この薬に含まれているのは？】

販売名	エンクラッセ 62.5 $\mu$ g エリプタ 7 吸入用 エンクラッセ 62.5 $\mu$ g エリプタ 30 吸入用
有効成分	ウメクリジニウム臭化物
添加物	乳糖水和物（夾雑物として乳蛋白を含みます）、 ステアリン酸マグネシウム

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・ 室温（1～30℃）で保管してください。
- ・ アルミ包装は使用開始直前まで開封しないでください。
- ・ 子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・ 絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・ 余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・ 症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・ 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：

グラクソ・スミスクライン株式会社 (<http://jp.gsk.com>)

カスタマー・ケア・センター

電話：0120-561-007

受付時間：9時～17時45分（土、日、祝日および当社休業日を除く）

## 吸入器(エリプタ®)をご使用になる方へ



《お願い》 お薬がムダになってしまうので、吸入するとき以外はカバーを開けないでください

### 表示の見方 カウンターの表示を確認してください

- 30** 薬の残りの使用回数が表示されます。未使用の状態では、最大使用回数<sup>※</sup>が表示されています。
- 9** 薬の残りが「9」以下になると、左側が赤色になります。
- 0** 薬がなくなり、カウンターが「0」になった後にカバーを開けると、カウンター表示が赤色になります。  
※「7」「14」「30」の3種類があります

### 用法・用量

主治医から指示された用法・用量に従ってください。  
(なるべく同じ時間帯に) 1日1回1吸入してください。


### 注意事項

- 包装トレイは使用開始直前に開封してください。
- 包装トレイ開封後は6週間以内に使用してください。薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。
- 高温多湿を避けて、室温で保管してください。
- カバーを開けるときの重さ(抵抗)を感じることや、きしみ音がすることがあります。これは、吸入器の内部で薬がセットされるとき音で、故障ではありません。
- カバーを開けてから吸入するまで、振ったり叩いたりしないでください。

### カバーを閉じた状態



### カバーを開けた状態



● エリプタには、薬剤が7回分、14回分、30回分充填された3種類のタイプがありますので、使用前にご確認ください。

## 吸入器(エリプタ)の使い方



《お願い》 お薬がムダになってしまうので、吸入するとき以外はカバーを開けないでください

1



### 「カチッ」と音がするまでカバーを開ける

吸入の準備完了です。カウンターが1つ減ったことを確認してください。  
カバーを開け、吸入せずに閉じた場合、その1回分は吸入できません。

※カバーを開けるとときに「カチッ」という音が聞こえにくい場合がありますが、カウンターが1つ減っていれば薬はセットされています

2



### 「フーツ」と息を吐き出す

無理をしない程度に息を吐き出してください。  
マウスピース(吸入口)に息を吹きかけないよう、注意してください。

3



### マウスピース(吸入口)全体をしっかりくわえ 思いっきり「スーーツ」と深く吸い込む

肺の奥まで、空気を送り届けるイメージです。



4



### 吸入器から口を離し3～4秒程度、息を止める

5



### ゆっくりと息を吐き、いつも通りに呼吸する

吸入後は吸入器(エリプタ)のカバーを閉じてください。

6



### 吸入後はうがいをする

のどや口の中に残っている薬を、洗い流しましょう。  
うがいは、副作用の予防になります。